SEANCE DU 9 FÉVRIER 1912

PRÉSIDENCE DE M. G. CHAUVEAUD, VICE-PRÉSIDENT.

M. F. Camus, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la dernière séance, dont la rédaction est adoptée.

Par suite de la présentation faite dans cette séance, M. le Président proclame membre de la Société

M. GUILLIERMOND, 19, rue de la République, à Lyon, présenté par MM. Dangeard et Matruchot.

Les *Rhipsalis* découverts en Afrique sont-ils indigènes?

PAR M. R. ROLAND-GOSSELIN[1].

Il a été décrit, comme espèces, plusieurs *Rhipsalis* trouvés sur le continent africain, à Zanzibar, à Madagascar, aux îles Mascareignes, etc... La plupart de ces plantes existent vivantes dans nos collections, et il devient possible aujourd'hui, après étude comparative, de se former une idée sur leur indigénat ou leur importation, par dessus l'Océan, des régions américaines.

Je possède depuis plus de quinze ans, en exemplaires, adultes maintenant, toutes les espèces de Weber, avec étiquettes de sa main, à l'aide desquelles je crois être en mesure de faire des comparaisons rendues sérieuses par l'authenticité des types.

Weber a décrit (*in* Revue hort., 1892) :

Rhipsalis madagascariensis.
— *suareziana.*
— *comorensis.*
— *zanzibarica.*

K. Schumann a décrit (*Monogr. Cact.*, p. 603).

Rhipsalis erythrocarpa.

1. Cette communication a été présentée à la séance du 12 janvier 1912. C'est par suite d'un oubli regrettable, lors de la mise en pages du fascicule de janvier, qu'elle figure seulement à cette place.